

ボトックス注入治療同意書

- ボトックスビスタもしくはニューロノックスはボツリヌス菌がつくり出すA型ボツリヌス毒素(天然のタンパク質)を有効成分とする薬です。
- 治療効果は2、3日～2週間で現れ、通常4～6ヵ月持続しますが、個人差があります。繰り返すうちにまれに耐性を生じ効果が出なくなることがあります。
- 注射後は強くこすったり、押さえたりしないで下さい。また内出血、多少の赤み、腫れ、感染症状、硬結、かゆみ、疼痛、発疹、頭痛、アレルギー症状などが出ることがあります。まれに腫れが強く出たり、内出血が出た場合には、落ち着くまでに1～2週間程度かかる場合があります。
- ボトックスの効果が強く出てしまったり、違和感や表情の動かしにくさを感じる場合があります。
- 妊娠中、授乳中の方は治療を受けられません。また妊娠する可能性のある方は、ボトックスの投与中および最終投与後の2回の月経を経るまでは避妊するようにして下さい。男性はボトックスの投与中および最終投与後の少なくとも3ヵ月は避妊するようにして下さい。
- 下記の方は治療を受けることができません。医師に申告して下さい。

◆妊娠中および授乳中の方は、胎児および乳児に対する安全性が確立されていないため使用できません。また、妊娠する可能性のある方は、ボトックスの投与中および最終投与後の2回の月経を経るまでは避妊するようにして下さい。男性は、ボトックスの投与中および最終投与後の少なくとも3ヵ月は避妊するようにして下さい。

◆この薬を以前に使用し、発疹などのアレルギーを経験したことがある場合や、アレルギー体質の方は、主治医に申し出て下さい。

◆使用中の薬剤は市販薬も含め主治医に申し出て下さい。特にアミノグリコシド系の抗生物質、パーキンソン病の治療薬、筋弛緩薬、精神安定剤等の投与を受けている方は主治医に申し出て、指示に従って下さい。これは、ボトックスをこれらと同時に使用すると、効果が強くあらわれることがあり、十分な観察のもとで投与を行う必要があるためです。

◆喘息などの慢性的な呼吸器の病気がある方、重度の筋力低下のある方、筋肉の萎縮のある方、緑内障のある方は主治医に申し出て下さい。

◆他の医療施設でボトックスの投与を受けている場合には、治療対象疾患および投与日、投与量を必ず主治医に申し出て下さい。

私は上記内容を理解し、自分自身の意思で施術を同意します。

年 月 日 氏名 印

20歳未満の方は親権者の方のご署名もお願い致します。

年 月 日 氏名 印